

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 （総コース数）
A-6	weekly GEM	卵巣癌・悪性リンパ腫・肺癌 肺癌・胆道癌・尿路上皮癌	共通	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	30min	d1,8,15	4(3投1休)w/C	-	-
A-26	Nivolumab	NSCLC,メタスタズ,腎がん,HL,頭頸部癌 胃癌,胸膜中皮腫,尿路上皮がん	共通	Nivolumab	240mg/body	div 30min	d1	2w/C	-	尿路上皮がん術後補助化学療法は最長1年
A-27	Pembrolizumab	NSCLC,腎がん,頭頸部癌, 尿路上皮癌,食道癌,メラノーマ 化学療法後に増悪した進行・再発 MSI High 固形癌 腎細胞癌（術後補助化学療法）※1 高リスク早期乳がん/HER2陽性乳癌（術後補助化学療法）※2	共通	Pembrolizumab	200mg/body	div 30min	d1	3w/C	-	※1：12ヶ月 ※2：9コース
A-28	Nivolumab480	NSCLC,メタスタズ,腎がん,HL,頭頸部癌 胃癌,胸膜中皮腫,尿路上皮がん	共通	Nivolumab	480mg/body	div 30min	d1	4w/C	-	尿路上皮がん術後補助化学療法は最長1年
A-29	Pembrolizumab400mg	NSCLC,腎がん,頭頸部癌, 尿路上皮癌,食道癌,メラノーマ 化学療法後に増悪した進行・再発 MSI High 固形癌 腎細胞癌（術後補助化学療法）※1 高リスク早期乳がん/HER2陽性乳癌（術後補助化学療法）※2	共通	Pembrolizumab	400mg/body	div 30min	d1	6w/C	-	※1：12ヶ月 ※2：5コース
H-6	GEM/CBDCA(GCarbo)	尿路上皮癌	泌尿器	GEM CBDCA	800mg/m <sup>2</sup> AUC 5	30min 1hr	d1,8 d2	3w/C	-	-
H-8	MTX/VBL/DXR/CDDP(MVAC)	尿路上皮癌	泌尿器	MTX VBL DXR CDDP	30mg/m <sup>2</sup> 3mg/m <sup>2</sup> 30mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup>	1hr 30min 1hr 3hr	d1,15,22 d2,15,22 d2 d2	4w/C	-	-
H-9	HD-MVAC	尿路上皮癌	泌尿器	MTX VBL DXR CDDP	30mg/m <sup>2</sup> 3mg/m <sup>2</sup> 30mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup>	1hr 30min 1hr 3hr	d1 d2 d2 d2	2w/C	-	-
H-12	GEM/CDDP(GC)	尿路上皮癌	泌尿器	GEM CDDP	1000mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup>	30min 3hr	d1,8,15 d2	4w/C	-	-
H-15	THP(Pirarubicin)	尿路上皮癌	泌尿器	THP	40mg/body	-	術後d1-3	-	-	-
H-23	Pembrolizumab	転移性尿路上皮癌(がん/化学療法増悪時)	泌尿器	Pembrolizumab	200mg/body	30min	d1	3w/C	d20	PDまで
H-27	Avelumab	根治切除不能な尿路上皮がん (化学療法後の維持療法)	泌尿器	Avelumab	10mg/kg	60min	d1	2w/C	-	-