

青森県立中央病院でがん治療を受ける患者さんへ①



こちらに記載のあるおくすりは、薬剤が原因となる顎骨壊死等や歯科処置（抜歯等）の際に止血しにくくなったり、傷の治りが悪くなる（創傷治癒遅延）といった口腔内の副作用を起こす可能性があるため注意が必要です。

使用している場合は、歯科医の先生や青森県立中央病院のスタッフにお知らせ下さい。また、使用中にお口の中に異常を感じる場合は、歯科医にご相談ください。



骨修復薬

口腔内に顎骨壊死等の副作用を起こす可能性があります。

開始前や投与中に定期的な歯科受診が必要な薬ですので、使用している場合はお知らせ下さい。

	一般名	商品名
ビスホスホネート製剤 (内服または注射)	アレンドロン酸ナトリウム	フォサマック、ボナロン
	リセドロン酸ナトリウム	アクトネル、ベネット
	エチドロン酸ナトリウム	ダイドロネル
	ミノドロン酸	ボノテオ、リカルボン
	パミドロン酸ナトリウム	パミドロン酸Na
	イバンドロン酸ナトリウム	ボンピバ
	ゾレドロン酸	ゾメタ、リクラスト
抗RANKL抗体（注射）	デノスマブ	ランマーク、プラリア
抗スクレロスチン抗体（注射）	ロモソズマブ	イベニティ

血管新生阻害薬（抗VEGF作用）

①口腔内に顎骨壊死等の副作用を起こす可能性があります

②歯科処置時の出血や創傷治癒遅延の恐れがあります

開始前や投与中に定期的な歯科受診が必要な薬ですので、使用している場合はお知らせ下さい

	一般名	商品名	内服薬の半減期
抗VEGF抗体（注射）	ベバシズマブ	アバスチン	
抗VEGFR2抗体（注射）	ラムシルマブ	サイラムザ	
VEGF阻害薬（注射）	アフリベルセプト	ザルトラップ	
マルチキナーゼ阻害薬 (内服)	ソラフェニブ	ネクサバル	t1/2=25.5hr
	スニチニブ	スーテント	t1/2=75.3hr
	パゾパニブ	ヴォトリエント	t1/2=37.8hr
	レゴラフェニブ	スチバーガ	t1/2=50hr
	アキシチニブ	インライタ	t1/2=5.9hr
	レンバチニブ	レンビマ	t1/2=46.5hr
	バンドタニブ	カブレルサ	t1/2=90.2hr
	カボサンチニブ	カボメティクス	t1/2=111hr
mTOR阻害剤 (内服または注射)	エベロリムス	アフィニトール	t1/2=36hr
	シロリムス	ラパリムス	t1/2=47.7hr
	テムシロリムス	トーリセル	

※体外消失の目安：半減期t1/2×5倍

青森県立中央病院でがん治療を受ける患者さんへ②



抗血栓薬

歯科処置時に止血しにくくなる恐れがありますので、使用している場合はお知らせ下さい。
処方医師の先生と休薬の必要性を確認しながら治療を進めていきます。

	一般名	商品名	術前休止期間
血小板凝集抑制剤	アスピリン	バイアスピリン、バファリン、タケルダ、キャブピリン、ファモター、ニトギス、イスキア、ゼンアスピリン	7日
	チクロピジン	パナルジン、マイトジン	10～14日
	チカグレロル	ブリリント	5日
	クロピドグレル	プラビックス、コンブラビン、ロレアス	14日以上
	プラスグレル	エフィエント	14日
	シロスタゾール	プレタール、コートリズム、シロシナミン	2日
	リマプロストアルファデックス	オパルモン、プロレナール	1日
	サルポグレラート	アンブラーグ	1日
	ベラプロスト	ケアロード、ベラサス	1日
その他	ワルファリン	ワーファリン	4日
	ダビガトラン	プラザキサ	1日
	エドキサバン	リクシアナ	1日
	リバーロキサバン	イグザレルト	1日
	アピキサバン	エリキュース	2-4日

※術前休止期間は一般的な目安であり、原病の再発予防を優先する必要があると処方医師が判断した場合には、休薬せずに抜歯等の歯科処置を行います。



青森県立中央病院のお口のカルテを確認している医療機関の方へ



当院発行のお口のカルテ1ページ目に骨修復薬・血管新生阻害薬・抗血栓薬を確認したらチェックする欄があります。
該当する薬剤がある場合には、チェックをお願いします。