

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
B-1-01	CHOP	悪性リンパ腫	血内	VCR DXR CPA PSL	1.4mg/m ² (max 2mg) 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body	30min 30min 2hr 内服	d1 d1 d1 d1-5	3w/C	-	6C
B-2-01	R-CHOP	悪性リンパ腫	血内	VCR DXR CPA RTX PSL	1.4mg/m ² (max 2mg) 50mg/m ² 750mg/m ² 375mg/m ² 100mg/body	30min 30min 2hr 初回:25mL/1hr →100mL/1hr →残液200mL/hr 2回目以降:100mL/1hr →残液200mL/hr 内服	d1 d1 d1 d3 d1-5	3w/C	-	6C
B-3-01	COP(CVP)	悪性リンパ腫	血内	VCR CPA PSL	1.4mg/m ² (max 2mg) 750mg/m ² 100mg/body	30min 2hr 内服	d1 d1 d1-5	4w/C	-	-
B-4-01	R-COP	非結核性リンパ腫	血内	VCR CPA RTX PSL	1.4mg/m ² (max 2mg) 750mg/m ² 375mg/m ² 100mg/body	30min 2hr 初回:25mL/1hr →100mL/1hr →残液200mL/hr 2回目以降:100mL/1hr →残液200mL/hr 内服	d1 d1 d3 d1-5	4w/C	-	-
B-103	Bendamustine	悪性リンパ腫	血内	HCS Bendamustine	100mg/body 120mg/m ²	- 1hr	d1-2 d1-2	3w/C	-	-
B-112-01	R-Bendamustine120	再発難治性 低悪性度B細胞リンパ腫	血内	RTX Bendamustine	375mg/m ² 120mg/m ²	初回:25mL/1hr →100mL/1hr →残液200mL/hr 2回目以降:100mL/1hr →残液200mL/hr 1hr	d1 d3-4	3w/C	-	-
B-113-01	EPOCH(Level1)療法	悪性リンパ腫	血内	VP-16 VCR DXR CPA PSL	50mg/m ² 0.4mg/m ² 10mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body	div 24hr div 24hr div 24hr div 2hr po	d1-4 d1-4 d1-4 d5 d1-5	3W	-	-
B-113-02	EPOCH(Level2)療法	悪性リンパ腫	血内	VP-16 VCR DXR CPA PSL	60mg/m ² 0.4mg/m ² 12mg/m ² 900mg/m ² 100mg/body	div 24hr div 24hr div 24hr div 2hr po	d1-4 d1-4 d1-4 d5 d1-5	3W	-	-
B-113-03	EPOCH(Level3)療法	悪性リンパ腫	血内	VP-16 VCR DXR CPA PSL	72mg/m ² 0.4mg/m ² 14.4mg/m ² 1080mg/m ² 100mg/body	div 24hr div 24hr div 24hr div 2hr po	d1-4 d1-4 d1-4 d5 d1-5	3W	-	-
B-113-04	EPOCH(Level4)療法	悪性リンパ腫	血内	VP-16 VCR DXR CPA PSL	86.4mg/m ² 0.4mg/m ² 17.3mg/m ² 1296mg/m ² 100mg/body	div 24hr div 24hr div 24hr div 2hr po	d1-4 d1-4 d1-4 d5 d1-5	3W	-	-
B-113-05	EPOCH(Level5)療法	悪性リンパ腫	血内	VP-16 VCR DXR CPA PSL	103.7mg/m ² 0.4mg/m ² 20.7mg/m ² 1555mg/m ² 100mg/body	div 24hr div 24hr div 24hr div 2hr po	d1-4 d1-4 d1-4 d5 d1-5	3W	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 （総コース数）
B-118	Brentuximab療法	再発難治性 CD30陽性お〃リンパ腫 未分化大細胞リンパ腫	血内	Brentuximab	1.8mg/kg	30min	d1	3w/C	-	-
B-124	Pralatrexate	悪性リンパ腫(PTCL)	血内	Pralatrexate	30mg/m ²	3~5min	d1,8,15,22,29,36	7w/C	-	-
B-126	Romidepsin	再発・難治性末梢性T細胞リンパ腫	血内	Romidepsin	14mg/m ²	4hr	d1,8,15	4w/C	-	-
B-130	R-GDP	悪性リンパ腫	血内	GEM CDDP RTX DEX	1000mg/m ² 75mg/m ² 375mg/m ² 40mg/body	30min 2hr 初回:25mL/1hr →100mL/1hr →残液200mL/hr 2回目以降:100mL/1hr →残液200mL/hr 内服	d1,8 d1 d1-5のうちに1回	3w/C	-	-
B-131	GDP	悪性リンパ腫	血内	GEM CDDP DEX	1000mg/m ² 75mg/m ² 40mg/body	30min 2hr 内服	d1,8 d1 d1-4	3w/C	-	-
B-136	Obinutumab	CD20陽性濾胞性リンパ腫	血内	Obinutumab	1000mg/body	初回 ①12ml/hr(30min) →②25ml/hr(30min) →③37ml/hr(30min) →④50ml/hr(30min) →⑤62ml/hr(30min) →⑥75ml/hr(30min) →⑦87ml/hr(30min) →⑧以後100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr) 2回目以降 ①25ml/hr(30min) →②50ml/hr(30min) →③75ml/hr(30min) →④以後100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr)	d1	-	-	-
B-138	G-CHOP	濾胞性リンパ腫	血内	VCR DXR CPA Obinutumab PSL	1.4mg/m ² (max 2mg) 50mg/m ² 750mg/m ² 1000mg/body 100mg/body	30min 30min 2hr 初回 ①12ml/hr(30min) →②25ml/hr(30min) →③37ml/hr(30min) →④50ml/hr(30min) →⑤62ml/hr(30min) →⑥75ml/hr(30min) →⑦87ml/hr(30min) →⑧100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr) 2回目以降 ①25ml/hr(30min) →②50ml/hr(30min) →③75ml/hr(30min) →④以後100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr) 内服	d1 d1 d1 1)-7目:d3,10,17, その後:d3のみ d1-5	3w/C	-	6C

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 （総コース数）
B-139	G-COP	濾胞性リンパ腫	血内	VCR CPA Obinutumab	1.4mg/m ² (max 2mg) 750mg/m ² 1000mg/body	30min 2hr 初回 ①12ml/hr(30min) →②25ml/hr(30min) →③37ml/hr(30min) →④50ml/hr(30min) →⑤62ml/hr(30min) →⑥75ml/hr(30min) →⑦87ml/hr(30min) →⑧100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr) 2回目以降 ①25ml/hr(30min) →②50ml/hr(30min) →③75ml/hr(30min) →④以後100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr)	d1 d1 1J-λ目→d3,10,17 2J-λ目以降→d3のみ	3w/C	-	6C
				PSL	100mg/body	内服	d1-5			
B-140	G-Bendamustine90	濾胞性リンパ腫	血内	Bendamustine Obinutumab	90mg/m ² 1000mg/body	1hr 初回 ①12ml/hr(30min) →②25ml/hr(30min) →③37ml/hr(30min) →④50ml/hr(30min) →⑤62ml/hr(30min) →⑥75ml/hr(30min) →⑦87ml/hr(30min) →⑧100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr) 2回目以降 ①25ml/hr(30min) →②50ml/hr(30min) →③75ml/hr(30min) →④以後100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr)	d1,2 1J-λ目→d3,10,17 2J-λ目以降→d3のみ	4w/C	-	6C
B-149	PBR	再発難治性びまん性 大細胞型B細胞リンパ腫	血内	Rituximab Polatuzumab- vedotin Bendamustine	375mg/m ² 1.8mg/kg 90mg/m ²	div 初回：25mL/1hr →100mL/1hr →残液200mL/hr 2回目以降：100mL/1hr →残液200mL/hr 初回90min、忍容性があれば2回 目以降30min 1hr	d1 d2 d2-3	3w/C	-	-
B-16	ABVD	結核リンパ腫	血内	VLB BLM DXR DTIC	6mg/m ² (max10mg) 9mg/m ² (max15mg) 25mg/m ² 250mg/m ²	30min 1hr 30min 2.5hr 点滴中遮光	d1,15 d1,15 d1,15 d1,15	4w/C	-	6C
B-143	Pembrolizumab療法	再発または難治性の 古典的結核リンパ腫	血内	Pembrolizumab	200mg/body	30min	d1	3w/C	d20	PDまで
B-22	ALL-O maintenance	急性リンパ性白血病	血内	VCR MTX 6MP PSL	1.3mg/m ² (max 2mg) 20mg/m ² 60mg/m ² 60mg/m ²	30min 内服 内服 内服	d1 d1,8,15,22 d1-28 d1-5	-	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 （総コース数）
B-119-01	Arzerra(初回)	CML(CD20陽性)	血内	Ofatumumab	300mg/body	①12ml/h(30min) →②25ml/h(30min) →③50ml/h(30min) →④100ml/h(30min) →⑤200ml/h(30min) →⑥300ml/h(30min) →⑦400ml/h(残液全量)	d1	1w/C	d7	12C
B-119-02	Arzerra(2回目以降)	CML(CD20陽性)	血内	Ofatumumab	2000mg/body	①25ml/h(30min) →②50ml/h(30min) →③100ml/h(30min) →④200ml/h(30min) →⑤400ml/h(残液全量)	1週毎8回目まで投与 4週休薬後、 4週毎に12回目まで投与	1w/C or 4w/C	d7 or d28	12C
B-109-02	Vidaza皮下注	骨髄異形成症候群	血内	Vidaza	75mg/㎡	懸濁液 皮下注	d1-7投,d8-28休	4(1投3休)w/C	-	-
B-64	V-CAP	多発性骨髄腫	血内	VCR DXR CPA PSL	1.5mg/body 25mg/㎡ 100mg/㎡ 60mg/㎡	30min 30min 内服 内服	d1 d1 d1-4 d1-4	-	-	6C
B-65-01	Velcade/Dex(静注)	多発性骨髄腫	血内	Velcade DEX	1.3mg/㎡ 20mg/body	30min 1hr	d1,4,8,11(d1,8,15,22) d1,4,8,11(d1,8,15,22)	3w/C	-	6C
B-65-02	Velcade/Dex(皮下)	多発性骨髄腫	血内	Velcade DEX	1.3mg/㎡ 20mg/body	皮下注 内服	d1,4,8,11(d1,8,15,22) d1,4,8,11(d1,8,15,22)	3w/C	-	6C
B-107-01	VMP	多発性骨髄腫	血内	Velcade L-PAM PSL	1.3mg/㎡ 8mg/㎡ 60mg/㎡	30min 内服 内服	1~4J-λ:d1,4,8,11 3週毎 5J-λ~:d1,8 3週毎 d1-4 cycles 1-9 d1-4 cycles 1-9	-	-	6C
B-107-02	VMP(皮下注)	多発性骨髄腫	血内	Velcade L-PAM PSL	1.3mg/㎡ 8mg/㎡ 60mg/㎡	皮下注 内服 内服	1~4J-λ:d1,4,8,11 3週毎 5J-λ~:d1,8 3週毎 d1-4 cycles 1-9 d1-4 cycles 1-9	-	-	6C
B-120-1	KRd(1J-λ目)	多発性骨髄腫	血内	KYP KYP DEX γカイトミド*	20mg/㎡(max44mg) 27mg/㎡(max59.4mg) 40mg/body 25mg/body	10min 10min 内服 内服	d1,d2 d8,d9,d15,d16 d1,8,15,22 d1-21	4w/C	-	-
B-120-2	KRd(2~12J-λ目)	多発性骨髄腫	血内	KYP DEX γカイトミド*	27mg/㎡(max59.4mg) 40mg/body 25mg/body	10min 内服 内服	d1,d2, d8,d9,d15,d16 d1,8,15,22 d1-21	4w/C	-	-
B-120-3	KRd(13J-λ目以降)	多発性骨髄腫	血内	KYP DEX γカイトミド*	27mg/㎡(max59.4mg) 40mg/body 25mg/body	10min 内服 内服	d1,d2, d15,d16 d1,8,15,22 d1-21	4w/C	-	-
B-121-01	ELd(1J-λ目)	多発性骨髄腫	血内	Elotuzumab DEX γカイトミド*	10mg/kg 28mg/body 25mg/body	d1:①30mL/h(30min) →②60mL/h(30min) →③120mL/h(残液全量) d8,15,22: ①60mL/h(30min) →②120mL/h(残液全量) 内服 内服	d1,d8,d15,d22 d1,d8,d15,d22 d1-21	4w/C	d7	-
B-121-02	ELd(2J-λ目)	多発性骨髄腫	血内	Elotuzumab DEX DEX γカイトミド*	10mg/kg 28mg/body 40mg/body 25mg/body	120mL/h 内服 内服 内服	d1,d8,d15,d22 d1,d15 d8,22 d1-21	4w/C	d7	-
B-121-03	ELd(3J-λ目以降)	多発性骨髄腫	血内	Elotuzumab DEX DEX γカイトミド*	10mg/kg 28mg/body 40mg/body 25mg/body	120mL/h 内服 内服 内服	d1,d15 d1,d15 d8,22 d1-21	4w/C	d14	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
B-122-01	DLd(13-1目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab ゾラミド DEX	16mg/kg 25mg/body 20mg/body	d1:①50mL/h(1h) →②100mL/h(1h) →③150mL/h(1h) →④200mL/h (残液全量) d8:①50mL/h(1h) →②100mL/h(1h) →③150mL/h(1h) →④200mL/h (残液全量) d15,d22: ①100mL/h(1h) →②150mL/h(1h) →③200mL/h (残液全量) 内服 内服	d1,d8,d15,d22 d1-21 d2,d9,d16,d23	4w/C	-	-
B-122-02	DLd(21-1目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab ゾラミド DEX	16mg/kg 25mg/body 20mg/body	①100mL/h(1h) →②150mL/h(1h) →③200mL/h(残液全量) 内服 内服	d1,d8,d15,d22 d1-21 d2,d9,d16,d23	4w/C	-	-
B-122-03	DLd(3~63-1目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab ゾラミド DEX DEX	16mg/kg 25mg/body 20mg/body 40mg/body	①100mL/h(1h) →②150mL/h(1h) →③200mL/h(残液全量) 内服 内服 内服	d1,d15 d1-21 d2,d16 d8,d22	4w/C	-	-
B-122-04	DLd(73-1目以降)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab ゾラミド DEX DEX	16mg/kg 25mg/body 20mg/body 40mg/body	①100mL/h(1h) →②150mL/h(1h) →③200mL/h(残液全量) 内服 内服 内服	d1 d1-21 d2 d8,d15,d22	4w/C	-	-
B-123-01	DBd(13-1目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab DEX Velcade	16mg/kg 20mg/body 1.3mg/m	d1:①50mL/h(1h) →②100mL/h(1h) →③150mL/h(1h) →④200mL/h(残液全量) d8:①50mL/h(1h) →②100mL/h(1h) →③150mL/h(1h) →④200mL/h(残液全量) d15:①100mL/h(1h) →②150mL/h(1h) →③200mL/h(残液全量) 内服 皮下注	d1,d8,d15 d2,d4,d5,d9,d11,d12 d1,d4,d8,d11	3w/C	-	-
B-123-02	DBd(2,31-1目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab DEX Velcade	16mg/kg 20mg/body 1.3mg/m	①100mL/h(1h) →②150mL/h(1h) →③200mL/h(残液全量) 内服 皮下注	d1,d8,d15 d2,d4,d5,d9,d11,d12 d1,d4,d8,d11	3w/C	-	-
B-123-03	DBd(4~83-1目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab DEX Velcade	16mg/kg 20mg/body 1.3mg/m	①100mL/h(1h) →②150mL/h(1h) →③200mL/h(残液全量) 内服 皮下注	d1 d2,d4,d5,d8,d9,d11,d12 d1,d4,d8,d11	3w/C	-	-
B-123-04	DBd(93-1目以降)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab	16mg/kg	①100mL/h(1h) →②150mL/h(1h) →③200mL/h(残液全量)	d1	4w/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
B-125-01	Kd(11-3目)	多発性骨髄腫	血内	KYP KYP DEX	20mg/㎡(max44mg) 56mg/㎡(max123.2mg) 20mg/body	30min 30min 内服	d1,d2 d8,d9,d15,d16 d1,d2,d8,d9,d15,d16, d22,d23	4w/C	-	-
B-125-02	Kd(21-3目以降)	多発性骨髄腫	血内	KYP DEX	56mg/㎡(max123.2mg) 20mg/body	30min 内服	d1,2,8,9,15,16 d1,d2,d8,d9,d15,d16, d22,d23	4w/C	-	-
B-147	Ven+AZA	急性骨髄性白血病 (未治療・寛解導入非適応)	血内	AZA Ven	75mg/㎡ 400mg（維持量） ※1コース目d1 100mg →d2 200mg	10min(div) or sc 1日1回内服	d1-7 d1-28	4w/C	-	-
B-148-01	DCd(1コース目)	多発性骨髄腫	血内	KYP Daratumumab	20mg/㎡ 56mg/㎡ 8mg/kg 16mg/kg	30min 30min 50ml/hr～200ml/hrで 速度指示あり 50ml/hr～200ml/hrで 速度指示あり	d1,2 d8,9,15,16 d1,2 d8,15,22	4w/C	-	-
B-148-02	DCd(2コース目)	多発性骨髄腫	血内	KYP Daratumumab	56mg/㎡ 16mg/kg	30min 100ml/hr～200ml/hrで 速度指示あり	d1,2,8,9,15,16 d1,8,15,22	4w/C	-	-
B-148-03	DCd(3～6コース目)	多発性骨髄腫	血内	KYP Daratumumab	56mg/㎡ 16mg/kg	30min 100ml/hr～200ml/hrで 速度指示あり	d1,2,8,9,15,16 d1,15	4w/C	-	-
B-148-04	DCd(7コース目以降)	多発性骨髄腫	血内	KYP Daratumumab	56mg/㎡ 16mg/kg	30min 100ml/hr～200ml/hrで 速度指示あり	d1,2,8,9,15,16 d1	4w/C	-	-
B-150-01	DLd皮下(1～2コース目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab LEN	1800mg/body 25mg/body	sc po	d1,8,15,22 d1-21	4w/C	-	-
B-150-02	DLd皮下(3～6コース目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab LEN	1800mg/body 25mg/body	sc po	d1,15 d1-21	4w/C	-	-
B-150-03	DCd皮下(1コース目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab LEN	1800mg/body 25mg/body	sc po	d1 d1-21	4w/C	-	-
B-151-01	DCd皮下(1コース目)	多発性骨髄腫	血内	KYP Daratumumab	20mg/㎡ 56mg/㎡ 1800mg/body	30min 30min sc	d1,2 d8,9,15,16 d1,d8,15,22	4w/C	-	-
B-151-02	DCd皮下(2コース目)	多発性骨髄腫	血内	KYP Daratumumab	56mg/㎡ 1800mg/body	30min sc	d1,2,8,9,15,16 d1,8,15,22	4w/C	-	-
B-151-03	DCd皮下(3～6コース目)	多発性骨髄腫	血内	KYP Daratumumab	56mg/㎡ 1800mg/body	30min sc	d1,2,8,9,15,16 d1,15	4w/C	-	-
B-151-04	DCd皮下(7コース目以降)	多発性骨髄腫	血内	KYP Daratumumab	56mg/㎡ 1800mg/body	30min sc	d1,2,8,9,15,16 d1	4w/C	-	-
B-152-01	DBd皮下(1～3コース目)	多発性骨髄腫	血内	Bortezomib Daratumumab	1.3mg/㎡ 1800mg/body	sc sc	d1,4,8,11 d1,8,15	3w/C	-	-
B-152-02	DBd皮下(4～8コース目)	多発性骨髄腫	血内	Bortezomib Daratumumab	1.3mg/㎡ 1800mg/body	sc sc	d1,4,8,11 d1	3w/C	-	-
B-152-03	DBd皮下(9コース目以降)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab	1800mg/body	sc	d1	4w/C	-	-
B-153-01	IsaPd(1コース目)	多発性骨髄腫	血内	Isatuximab Pomalidomide	10mg/kg 4mg/body	div 175mg/hr ～400mg/hr（最大） po	d1,8,15,22 d1-21	4w/C	-	-
B-153-02	IsaPd(2コース目以降)	多発性骨髄腫	血内	Isatuximab Pomalidomide	10mg/kg 4mg/body	div 175mg/hr ～400mg/hr（最大） po	d1,15 d1-21	4w/C	-	-
B-154-01	Epd(1コース目)	多発性骨髄腫	血内	Elotuzumab Pomalidomide	10mg/kg 4mg/body	d1:①30mL/h (30min) →②60mL/h (30min) →③120mL/h(残液全量) d8:①180mL/h (30min) →②240mL/h(残液全量) d15,22:①300mL/h po	d1,d8,d15,d22 d1-21	4w/C	-	-
B-154-02	Epd(2コース目)	多発性骨髄腫	血内	Elotuzumab Pomalidomide	10mg/kg 4mg/body	div 300mL/h po	d1,d8,d15,d22 d1-21	4w/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
B-154-03	Epd(3コース目)	多発性骨髄腫	血内	Elotuzumab Pomalidomide	20mg/kg 4mg/body	div 180mL/hr(30min) →240mL/hr(残液) po	d1 d1-21	4w/C	-	-
B-154-04	Epd(4コース目以降)	多発性骨髄腫	血内	Elotuzumab Pomalidomide	20mg/kg 4mg/body	div 300mL/h po	d1 d1-21	4w/C	-	-
B-155-01	DCyBorD皮下（1～2コース目）	全身性ALアミロイドーシス	血内	DEX Daratumumab Bortezomib	40mg/body 1800mg/body 1.3mg/m ²	div 2hr po 1日1回 sc sc	d1,8,15,22 d1,8,15,22 d1,8,15,22	4w/C		2/24C
B-155-02	DCyBorD皮下（3～6コース目）	全身性ALアミロイドーシス	血内	CPA DEX Daratumumab Bortezomib	300mg/m ² 40mg/body 1800mg/body 1.3mg/m ²	300mg/m ² po 1日1回 sc sc	d1,8,15,22 d1,8,15,22 d1,15 d1,8,15,22	4w/C		4/24C
B-155-03	DCyBorD皮下（7～24コース目）	全身性ALアミロイドーシス	血内	Daratumumab	1800mg/body	sc	d1	4w/C		18/24C
B-156-01	DMPB皮下（1コース目）	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab Bortezomib Melphalan PSL	1800mg/body 1.3mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ²	sc sc po 1日1回空腹時 po 1日1回 食後	d1,8,15,22,29,36 d1,4,8,11,22,25,29,32 d1-4 d2-4	6w/C	-	-
B-156-02	DMPB皮下（2～9コース目）	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab Bortezomib Melphalan PSL	1800mg/body 1.3mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ²	sc sc po 1日1回空腹時 po 1日1回 食後	d1,22 d1,8,22,29 d1-4 d2-4	6w/C	-	-
B-156-02	DMPB皮下（9コース目以降）	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab	1800mg/body	sc	d1	4w/C	-	-
B-69	VCR/PSL	リンパ系腫瘍	血内	VCR PSL	1.5mg/body 60mg/body	30min 内服	d1 d1-4	-	-	-
B-70	VP-16	リンパ系腫瘍	血内	VP-16	100mg/body	2hr	d1-3	-	-	6C
B-71	VP-16/Dex	リンパ系腫瘍	血内	VP-16 DEX	100mg/body 16.5mg/body	2hr 1hr	d1-3 d1-3	-	-	6C
B-72	MCNU	骨髄腫,MPD,CNSリンパ腫	血内	MCNU	50,75,100mg/body	1hr	d1	4w/C	-	-
B-157-1,2	weekly Kd	多発性骨髄腫	血内	KYP DEX	20mg/m ² →70mg/m ² 40mg/body	div 30min po	d1,8,15 d1,8,15,22	4w/C	-	-
B-158	Pola+R-CHP	悪性リンパ腫 (びまん性大細胞型リンパ腫)	血内	Pola RTX DXR CPA PSL	1.8mg/kg 375mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body	div初回90min→以後30min 初回:25mL/1hr →100mL/1hr →残液200mL/hr 2回目以降:100mL/1hr →残液200mL/hr div 30min div 2hr po	d1 d1-7に1回投与 d1 d1 d1-5	4w/C	-	-
B-159	ABVD375	ホジキンリンパ腫	血内	VLB BLM DXR DTIC	6mg/m ² 9mg/m ² 25mg/m ² 375mg/m ²	div 30min div 30min div 30min div 2.5hr	d1 d1 d1 d1	4w/C	-	-
B-160-01	A-AVD375	ホジキンリンパ腫	血内	Brentuximab-V VLB BLM DXR DTIC	1.8mg/kg 6mg/m ² 9mg/m ² 25mg/m ² 375mg/m ²	div 30min div 30min div 30min div 30min div 2.5hr	d1 d1 d1 d1 d1	4w/C	-	-
B-160-02	A-AVD250	ホジキンリンパ腫	血内	Brentuximab-V VLB BLM DXR DTIC	1.8mg/kg 6mg/m ² 9mg/m ² 25mg/m ² 250mg/m ²	div 30min div 30min div 30min div 30min div 2.5hr	d1 d1 d1 d1 d1	4w/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
B-161	R-Bendamustin90	未治療CLL	血内	RTX Bendamustin	C1:375mg/㎡ C2-6:500mg/㎡ 90mg/㎡	初回:50ml/hr →100ml/hr→150ml/hr →200ml/hr→250ml/hr →300ml/hr→350ml/hr →400ml/hr(最大) 2回目:100ml/hr →200ml/hr→300ml/hr →400ml/hr(最大) div 1hr	d1 d3-4	4w/C	-	-
B-164-01	IsaKd(11-λ目)	多発性骨髄腫	血内	Isatuximab KYP	10mg/kg 20mg/㎡ 56mg/㎡	div 175mg/hr ～400mg/hr（最大） 30min	d1,8,15,22 d1,2 d8,9,15,16	4w/C	-	-
B-164-02	IsaKd(2コース目以降)	多発性骨髄腫	血内	Isatuximab KYP	10mg/kg 56mg/㎡	div 175mg/hr ～400mg/hr（最大） 30min	d1,15 d1,2,8,9,15,16	4w/C	-	-
B-169	Ven-R	再発難治性 CLL	血内	RTX Ven	11-λ目375mg/㎡ 21-λ目以降500mg/㎡ 400mg/body	div 50-400ml/h div 100-400ml/h p.o. 1×	d1 d1-28	4w/C	-	6C
B-170	Elranatamab(皮下)	再発難治性 多発性骨髄腫	血内	Elranatamab	12mg/body 32mg/body 76mg/body	sc sc sc	C1d1 C1d4 C2以降d1	1w/C(24コースまで) 2w/C(25コース以降)	-	-
B-171	A-CHP	CD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫	血内	BV DXR CPA PSL	1.8mg/kg 50mg/㎡ 750mg/㎡ 100mg/body	div 30min div 30min div 2hr 内服	d1 d1 d1 d1-5	3W	-	8C
B-172	Obinutumab+Acalabrutinib	CD20陽性慢性リンパ性白血病	血内	Acalabrutinib Obinutumab	200mg/body 100mg/body 900mg/body 1000mg/body	内服 div 25ml/h ①13ml/h(30min)→ ②25ml/h(30min)→ ③38ml/h(30min)→ ④50ml/h(30min)→ ⑤63ml/h(30min)→ ⑥75ml/h(30min)→ ⑦88ml/h(30min)→ ⑧以降30min毎に12.5mlずつ (max100ml/h) ①25ml/h(30min)→ ②50ml/h(30min)→ ③75ml/h(30min)→ ④以降100ml/hr(残液全量)	d1-28 C2d1 C2d2 C2d8,15 C3-7d1	4W	-	8C以降 Acalabrutinib内服のみ
B-173-01	IsaVRd（11-λ目）	多発性骨髄腫	血内	Bortezomib Isatuximab レナリドミド デカドロン	1.3mg/m ² 10mg/kg 25mg/body 20mg/body	sc 初回 ①25ml/h（1hr）→ ②50ml/h（30min）→ ③75ml/h（30min）→ ④100ml/h（30min）→ ⑤125ml/h（30min）→ ⑥150ml/h（残液） 2回目 50ml/（30min）→100ml/h （30min）→200ml/h（残液） 3回目以降 200ml/h 内服 内服	d1,4,8,11,22,25,29,32 d1,8,15,22,29 d1-14,d22-35 d2,4,5,9,11,12,23,25,26,30,32, 33	6W	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
B-173-02	IsaVRd（2-4J-3目）	多発性骨髄腫	血内	Bortezomib Isatuximab レナリドミド デカドロン	1.3mg/m ² 10mg/kg 25mg/body 20mg/body	sc div 200ml/h 内服 内服	d1,4,8,11,22,25,29,32 d1,15,29 d1-14,d22-35 d2,4,5,8,9,11,12,22,23,25,26,30, 32,33	6W	-	-
B-173-03	IsaVRd（5-17J-3目）	多発性骨髄腫	血内	Isatuximab レナリドミド デカドロン	10mg/kg 25mg/body 20mg/body	div 200ml/h 内服 内服	d1,15 d1-21 d8,22	4W	-	-
B-173-04	IsaVRd（18J-3目以降）	多発性骨髄腫	血内	Isatuximab レナリドミド デカドロン	10mg/kg 25mg/body 20mg/body	div 200ml/h 内服 内服	d1 d1-21 d8,15,22	4W	-	-
B-174	R-GCD	悪性リンパ腫	血内	GEM CBDCA DEX RTX	1000mg/m ² AUC5 40mg/body 375mg/m ²	30min 1hr p.o.（またはiv） 初回：50mL/hr→100mL/hr→ 150mL/hr→200mL/hr→ 250mL/hr→300mL/hr→ 350mL/hr→400mL/hr（最大） 2回目以降：100mL/hr→ 200mL/hr→300mL/hr→ 400mL/hr（最大）	d1,8 d1 d1-4 d8	3W/C	-	4C
B-175	Monsunetuzumab	再発または難治性の濾胞性リンパ腫	血内	Monsunetuzumab	1mg/body 2mg/body 60mg/body 30mg/body	div 4hr div 4hr div 4hr div 2hr（忍容性が良好の場合） div 2hr	C1d1 C1d8 C1d15 C2d1 C3以降d1	4W/C	-	CR:C SD・PR:17C
B-176-1	DBLd【皮下】 1-2コース目	造血幹細胞移植不適応の 未治療多発性骨髄腫	血内	Bortezomib Daratumumab レブラミド デカドロン	1.3mg/m ² 1800mg/body 25mg/body 20mg/body	sc sc 内服 内服	d1,4,8,11 d1,8,15 d1-14 d2,4,5,9,11,12	3W/C	-	2C
B-176-2	DBLd【皮下】 3-8コース目	造血幹細胞移植不適応の 未治療多発性骨髄腫	血内	Bortezomib Daratumumab レブラミド デカドロン	1.3mg/m ² 1800mg/body 25mg/body 20mg/body	sc sc 内服 内服	d1,4,8,11 d1 d1-14 d2,4,5,9,11,12	3W/C	-	6C
B-176-3	DBLd【皮下】 9コース目以降	造血幹細胞移植不適応の 未治療多発性骨髄腫	血内	Daratumumab レブラミド デカドロン	1800mg/body 25mg/body 40mg/body	sc 内服 内服	d1 d1-21 d8,15,22	4W/C	-	-
B-177-1	DBLd【皮下】 1-4コース目	造血幹細胞移植適応の 未治療多発性骨髄腫	血内	Bortezomib Daratumumab レブラミド デカドロン	1.3mg/m ² 1800mg/body 25mg/body 40mg/body	sc sc 内服 内服	d1,4,8,11 d1,8,15,22（C1のみd8,22必須） d1-21 d2,3,4,9,10,11,12	4W/C	-	4C
B-177-2	DBLd【皮下】 5-6コース目	造血幹細胞移植適応の 未治療多発性骨髄腫	血内	Bortezomib Daratumumab レブラミド デカドロン	1.3mg/m ² 1800mg/body 25mg/body 40mg/body	sc sc 内服 内服	d1,4,8,11 d1,15 d1-21 d2,3,4,9,10,11,12	4W/C	-	2C
B-177-3	DBLd【皮下】 7コース目以降	造血幹細胞移植適応の 未治療多発性骨髄腫	血内	Daratumumab レブラミド	1800mg/body 10mg/body	sc 内服	d1 d1-28	4W/C	-	2C
B-178	Talquetamab【B法】	多発性骨髄腫	血内	Talquetamab	漸増期 0.01mg/kg 0.06mg/kg 0.4mg/kg 0.8mg/kg 継続投与期 0.8mg/kg	sc	①d1 ② ①+2-4日 ③ ②+2-4日 ④ ③+2-4日 d1	2W/C	-	-
B-179	在宅用Blinatumomab（18歳以上）	再発難治性B-ALL	血内	Blinatumomab	BW45kg以上 9μg/body/day BW45kg未満 5μg/m ² /day BW45kg以上 28μg/body/day BW45kg未満 15μg/m ² /day	C1d1-7 C1d8-28,C2以降d1-28	cv 24hr	①C1～5 寛解導入療法として2サイクル、 地固め療法として最大3サイクル （28日投与、14日休業） ②C6～9 維持療法として最大4サイクル まで （28日投与、56日休業）	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
B-180	Epcoritamab【皮下】 2ステップ漸増療法	再発または難治性のB細胞性リンパ腫 (DLBCL、高悪性度B細胞リンパ腫、原発性 縦隔大細胞型B細胞リンパ腫)、再発または 難治性のFL(Grade3B)	血内	Epcoritamab	0.16mg/body 0.8mg/body 48mg/body	sc	C1d1 C1d8 C1d15,22 C2-3 d1,8,15,22 C4-9 d1,15 C10以降d1	4W/C	-	-
B-181	Epcoritamab【皮下】 3ステップ漸増療法	再発または難治性のFL(Grade1～3A)	血内	Epcoritamab	0.16mg/body 0.8mg/body 3mg/body 48mg/body	sc	C1d1 C1d8 C1d15 C1d22 C2-3 d1,8,15,22 C4-9 d1,15 C10以降d1	4W/C	-	-
B-182	Isa単剤療法	多発性骨髄腫	血内	Isatuximab	20mg/kg	初回 ①25ml/h（1hr）→ ②50ml/h（30min）→ ③75ml/h（30min）→ ④100ml/h（30min）→ ⑤125ml/h（30min）→ ⑥150ml/h（残液） 2回目 50ml/（30min） →100ml/h（30min） →200ml/h（残液） 3回目以降 200ml/h	C1 d1,8,15,22 C2以降 d1,15	4W/C	-	-
B-183	Isad療法	多発性骨髄腫	血内	DEX Isatuximab	40mg/body ※75歳以上20mg 20mg/kg	p.o 初回 ①25ml/h（1hr）→ ②50ml/h（30min）→ ③75ml/h（30min）→ ④100ml/h（30min）→ ⑤125ml/h（30min）→ ⑥150ml/h（残液） 2回目 50ml/（30min） →100ml/h（30min） →200ml/h（残液） 3回目以降 200ml/h	d1,8,15,22 C1 d1,8,15,22 C2以降 d1,15	4W/C	-	-
B-184	Atezolizumab	再発または難治性の 節外性NK/T細胞リンパ腫・鼻型	血内	Atezolizumab	1200mg/body	cv 初回1hr 忍容性あれば2回目以降30min	d1	3W/C	-	-
B-185	Teclistamab	多発性骨髄腫	血内	Teclistamab	0.06mg/kg 0.3mg/kg 1.5mg/kg 1.5mg/kg	sc	漸増期 ①d1 ② ①+2-4日 ③ ②+2-4日 継続投与期 d1※C2はC1 1.5mg/kg投与の7日 後	漸増期：2-4日 維持期：1週(24C以降2週毎投与可)	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
B-186	Weekly IsaVRd療法	多発性骨髄腫	血内	Bortezomib Isatuximab レナリドミド デカドロン	1.3mg/ml 10mg/kg 25mg/body 20mg/body	sc 初回 ①25ml/h（1hr）→ ②50ml/h（30min）→ ③75ml/h（30min）→ ④100ml/h（30min）→ ⑤125ml/h（30min）→ ⑥150ml/h（残液） 2回目 50ml/（30min）→100ml/h （30min）→200ml/h（残液） 3回目以降 200ml/h 内服 内服	C1-12 d1,8,15 C13-18 d1,15 C19以降 off C1d1,8,15,22 C2-12 d1,15 C13以降 d1 d1-21 C1d1,8,15,22 C2-12 d8,22 C13以降 off	4W	-	-
B-187	Ven+AraC皮下注療法	急性骨髄性白血病	血内	AraC Ven	20mg/ml 100mg 200mg 400mg 600mg ※CYP3A阻害薬併用時 ◎強い阻害剤 10mg→20mg→50mg(維持量) ◎中等度阻害剤 50mg以下→100mg以下→200mg以下 (維持量)	sc po po po po	d1-10 C1d1 C1d2 C1d3 C1d4-(維持量)	4W	-	-
B-188	Daratumumab【皮下】療法	高リスクのくすり型多発性骨髄腫	血内	Daratumumab	1800mg/body	sc	C1:d1,8,15,22 C2-6:d1,15 C7以降d1	4W	-	最長39コース
B-189	Mosunetuzumab-axgbsc+ Polatuzumab vedotin療法	DLBCL	血内	Polatuzumab vedotin Mosunetuzumab	1.8mg/kg 5mg 45mg	div 初回90min 2回目以降30min sc 30sec~2min sc 30sec~2min	C1-6 d1 C1d1 C1d8,15 C2-8以降 d1	3W	-	6+2コース
B-190	BelaPd療法	多発性骨髄腫	血内	Belantamab Pomalidomide Dexamethasone	2.5mg/kg 1.9mg/kg 4mg/body 40mg/body(高齢者20mg/body)	div 30min div 30min po po 朝	C1d1 C2以降d1 d1-21 d1,8,15,22	4W	-	-
B-192	Tal-Tec療法 漸増期	腸外性形質細胞腫を有する再発・難治性多 発性骨髄腫	血内	Talquetamab(漸増期) Tecilistamab(漸増期) Talquetamab(継続投与期) Tecilistamab(継続投与期)	0.01mg/kg 漸増用量① 0.06mg/kg 漸増用量② 0.4mg/kg 漸増用量③ 0.8mg/kg 治療用量 0.06mg/kg 漸増用量① 0.3mg/kg 漸増用量② 1.5mg/kg 漸増用量③ 3.0mg/kg 治療用量 0.8mg/kg 3.0mg/kg	sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc	①d1 ② ①+2-4日 ③ ②+2-4日 ④ ③+2-4日 ①d1 ② ①+2-4日 ③ ②+2-4日 ④ ③+2-4日 d1 d1	漸増期:2-4日 継続期:14日(継続期開始から23週以 降、15週以降でVGPR以上の奏効があ る場合は28日間隔の投与可能)	-	-
B-193	Denileukin Diftitox(レミトロ)	再発・難治性末梢性T細胞リンパ腫、 再発難治性 皮膚T細胞リンパ腫	血内	レミトロ	9μg/kg	div 1hr	d1-5	3W/C	-	-